

Calendario Rutinario

Edad*	Vacuna			
6 meses– 4 años	Pfizer– Bebés/Niños Pequeños	1ra Dosis	3-8 semanas [^]	2da Dosis
				≥8 semanas
				3ra Dosis Inicial Pfizer Bivalente^β
6 meses– 5 años	Moderna– Bebés/Niños Pequeños	1ra Dosis	4-8 semanas [^]	2da Dosis
5–11 años	Pfizer– Pediátrico	1ra Dosis	3-8 semanas [^]	2da Dosis
6–11 años	Moderna– Pediátrico	1ra Dosis	4-8 semanas [^]	2da Dosis
12+ años	Moderna– Adol/Adulto	1ra Dosis	4-8 semanas [^]	2da Dosis
12+ años	Pfizer/ Adol/Adulto	1ra Dosis	3-8 semanas [^]	2da Dosis
12+ años	Novavax	1ra Dosis	3-8 semanas [^]	2da Dosis
18+ años	Janssen (J&J) Pfizer/Moderna/ Novavax preferido**	1ra Dosis		

Dosis de Refuerzo Bivalente[†]

Moderna:

- 6 meses–5 años
- 6+ años

Pfizer:

- 5-11 años
- 12+ años

(Para las personas que recibieron previamente una(s) dosis de refuerzo monovalente, el refuerzo bivalente se administra al menos 2 meses después de la última dosis de refuerzo monovalente)

* [Vea los horarios para niños en transición de un grupo de edad más joven a mayor.](#)

** Aunque se prefiere el uso de las vacunas ARNm COVID-19 y Novavax, la vacuna Janssen se puede ofrecer en [algunas situaciones.](#)

† Para las personas que no han recibido ninguna dosis de refuerzo y no pueden o no quieren recibir la vacuna de refuerzo bivalente, el refuerzo [monovalente de Novavax puede administrarse como una dosis de refuerzo única](#) al menos 6 meses después de completar la serie primaria a personas mayores de 18 años.

[^] Un [intervalo de 8 semanas](#) puede ser preferible para algunas personas, especialmente para hombres de 12 a 39 años.

^β Los niños que ya han recibido 3 dosis monovalentes no son elegibles para la vacuna bivalente de Pfizer en este momento.

Consulte las [Consideraciones clínicas provisionales para el uso de las vacunas contra el COVID-19](#) para obtener más detalles. El calendario esta sujeto a cambios

Calendario si esta moderada o gravemente inmunocomprometido

Edad*	Vacuna	1ra Dosis		2da Dosis		3ra Dosis Inicial
6 meses– 4 años	Pfizer– Bebés/Niños Pequeños	1ra Dosis	3 semanas	2da Dosis	≥8 semanas	● Pfizer Bivalentβ
6 meses– 5 años	Moderna– Bebés/Niños Pequeños	1ra Dosis	4 semanas	2da Dosis	≥4 semanas	Refuerzo Bivalente† Moderna: ● 6 meses–5 años ● 6+ años Pfizer: ● 5-11 años ● 12+ años (Para las personas que recibieron previamente una(s) dosis de refuerzo monovalente, el refuerzo bivalente se administra al menos 2 meses después de la última dosis de refuerzo monovalente).
5–11 años	Pfizer– Pediátrico	1ra Dosis	3 semanas	2da Dosis	≥4 semanas	
6–11 años	Moderna– Pediátrico	1ra Dosis	4 semanas	2da Dosis	≥4 semanas	
12+ años	Moderna– Adol/Adulto	1ra Dosis	4 semanas	2da Dosis	≥4 semanas	
12+ años	Pfizer/ Adol/Adulto	1ra Dosis	3 semanas	2da Dosis	≥4 semanas	
12+ años	Novavax	1ra Dosis	3 semanas	2da Dosis		
18+ años	Janssen (J&J) Pfizer/Moderna/ Novavax preferido**	1ra Dosis	4 semanas	2da Dosis de Moderna/Pfizer		

* [Vea los horarios para niños en transición de un grupo de edad más joven a mayor.](#)

** Aunque se prefiere el uso de las vacunas ARNm COVID-19 y Novavax, la vacuna Janssen se puede ofrecer en [algunas situaciones.](#)

† Para las personas que no han recibido ninguna dosis de refuerzo y no pueden o no quieren recibir la vacuna de refuerzo bivalente, se puede administrar el refuerzo de [Novavax monovalente como una dosis de refuerzo única](#) al menos 6 meses después de completar la serie primaria a personas mayores de 18 años.

β Los niños que ya han recibido 3 dosis monovalentes no son elegibles para la vacuna bivalente de Pfizer en este momento.

[Consulte las Consideraciones clínicas provisionales para el uso de las vacunas contra el COVID-19](#) para obtener más detalles. El calendario esta sujeto a cambios.